

垂序崖豆——中国崖豆藤属一新记录种

钱义咏

(云南省思茅行署林业局 思茅 665000)

Millettia pendula Benth. (Papilionaceae), a new record to China

QIAN Yi-Yong

(Forestry Bureau, Simao Administrative Office of Yunnan Province, Simao 665000)

Key words *Millettia*; *Millettia pendula* Benth.; New record; China

关键词 崖豆藤属; 垂序崖豆; 新记录; 中国

垂序崖豆 图 1

Millettia pendula Benth. (in Miq. Pl. Jungh. 250. 1852, nom. nud.) ex Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:105. 1879; Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 28: 40. 1890; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 41: 186. 1912; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 384. 1916. TYPE: Myanmar (not seen). Fig. 1

China. Yunnan (云南): Jiangcheng (江城), alt. 1100 m, in sparse forests, 1992-04-05, Y. Y. Qian (钱义咏) 2518 (PE; ZM; HITBC); the same locality, 2243 (HITBC; PE). New Record. (新记录)

乔木, 高 6~7 m; 枝幼时被锈色短柔毛, 后变无毛, 皮孔圆形, 平坦。羽状复叶长 25~50 cm; 叶柄长 4.5~14 cm, 幼时被锈色短柔毛, 后变无毛; 托叶卵形, 长 2~3 mm, 密被短柔毛; 小叶(2~)3~4对, 近革质, 披针状长圆形, 基部一对卵状披针形, 长 8~30 cm, 宽 2.5~6 cm, 先端尾状渐尖, 基部圆钝或楔形, 幼时上面沿中脉被短柔毛, 老时变无毛, 下面被平伏硬毛, 后秃净; 侧脉 7~9 对, 两面均隆起; 小叶柄长 4~6 mm; 小托叶针刺状, 长约 1 mm, 被短柔毛。总状圆锥花序腋生或顶生, 下垂, 长(15~)25~45 cm, 多分枝; 总花梗长 1~4 cm, 密被锈色硬毛; 花白色, 长 1.1~1.3 cm; 花梗长 2~3 mm; 苞片和小苞片线形, 长 1~2 mm, 均早落; 花萼钟形, 长 5~6 mm, 宽 6~6.5 mm, 密被短柔毛, 萼齿三角形, 急尖, 稍短于萼筒, 上方 2 齿连合, 顶端 2 小尖; 旗瓣无毛, 卵形, 长 10 mm, 基部具耳; 无胼胝体; 翼瓣镰形, 先端钝, 基部具耳; 龙骨瓣倒卵形, 先短钝, 基部具耳; 雄蕊单体, 对旗瓣的一枚花丝基部分离; 子房线形, 被锈色绢毛, 胚珠(3~)4, 花柱与子房成直角上弯。荚果长圆形, 长 10~17 cm, 宽 2.7~3.5 mm, 被短柔毛, 扁平, 稍弧曲, 两端渐狭, 顶端具短喙, 果瓣木质; 种子(3~)4, 扁圆形, 长约 1.5 cm, 宽约 0.6 cm。花期 3~4 月, 果期 6~11 月。

中国云南新记录。缅甸、泰国、老挝也有分布。

致谢 韦直先生鉴定标本, 赐给文献资料和宝贵意见, 特此致谢。




图1 垂序崖豆 1. 花枝; 2. 花; 3. 旗瓣; 4. 翼瓣; 5. 龙骨瓣; 6. 雄蕊; 7. 雌蕊; 8. 萼; 9. 萼展开; 10. 荚果。(孙英宝 绘)

Fig. 1 *Millettia pendula* Benth. 1. Flowering branch; 2. Flower; 3. Standard; 4. Wing; 5. Keel; 6. Stamens; 7. Pistil; 8. Calyx; 9. Calyx opened; 10. Legume.

(责任编辑 徐黎)